АЛГОРИТМ ВОЗ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВЫДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕСТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЖАЛОБЫ НА ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПО ИППП
ИЛИ
ИМЕЮТСЯ СИМПТОМЫ ИППП У ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА
ИЛИ
БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВНИЗУ ЖИВОТА/ ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

ДА

1. ЛЕЧИТЬ ОТ ГОНОРЕИ, ХЛАМИДИОЗА И ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
2. ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ СЕКСУ
3. ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ
4. ЛЕЧИТЬ ПАРТНЕРОВ

НЕТ

1. ЛЕЧИТЬ ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ, ТРИХОМОНИАЗ, БВ.
2. ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ СЕКСУ
3. ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

WHO MODEL PRESCRIBING INFORMATION. DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND HIV INFECTION. WORLD HEALTH ORGANISATION. GENEVA 1995.